




LES FICHES PEDAGOGIQUES

[www.diconimoz.com](http://www.diconimoz.com)



# Cardinal rouge

 Northern cardinal



*Monique Coulombe 2013*

(Photo Monique Coulombe)

Très présent dans l'Est de l'Amérique du nord, le cardinal rouge se retrouve également du centre vers le sud, jusqu'au nouveau Mexique. Possédant un dimorphisme sexuelle, très marqué, le plumage du mâle est rouge vif, avec un masque noir autour des yeux, tandis que la

femelle est brun jaune. Chez le juvénile, le bec est rouge orangé. Possédant également une petite crête caractéristique derrière la tête, le cardinal rouge fréquente les lisières de forêts et les zones boisées, proches de cours d'eau. Très territoriaux, les mâles cardinaux rouges, dont les plumages les plus vifs ont plus de succès auprès des femelles, défendent leurs territoires contre leurs concurrents.

**NOM :** Cardinale rouge (*Cardinalis cardinalis*)

**CLASSE :** [Oiseaux](#)

**ORDRE :** Passériformes

**FAMILLE :** Cardinalidés

**TAILLE :** 21 à 23 cm, envergure 25 à 31 cm

**POIDS :** 40 à 50 g

**DUREE DE VIE :** 15 ans

**REPARTITION :** Amérique du Nord, Floride, Mexique, Guatemala

**HABITAT :** Zones boisées, lisères de forêt, marécages, parcs et jardins...

**ALIMENTATION :** [Granivore](#) : graines, fruits, mais aussi de petits bourgeons, sève de pins.

**REPRODUCTION :** La maturité sexuelle du cardinal rouge est atteinte vers l'âge de 1 an, la durée d'incubation est de 11 à 13 jours, et la femelle dépose 1 à 5 oeufs blanc à verdâtre, tachetés de brun.

**PREDATEURS :** Rapaces, chats domestiques et autres félins.