




LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Barbican à tête rouge

 Red and yellow barbet



(Photo Philippe Guerlet)

Principalement présent en Afrique de l'Est (Tanzanie, Kenya) le barbican à tête rouge fait partie de la famille des lybiidés. Dépassant rarement, les 20 centimètres et les 70 grammes, le barbican à tête rouge se caractérise par un plumage noir moucheté de blanc, ainsi que par sa poitrine orangée, son ventre jaune et sa face rouge. Oiseau sédentaire, le barbican à tête rouge se nourrit essentiellement d'insectes et préfère les terrains accidentés, comme les lits de rivières

et les endroits rocaillieux. Particulièrement ingénieux, c'est en creusant des tunnels, que le barbican à tête rouge, installe son nid à l'intérieur de termitières. C'est ainsi, qu'il se retrouve aux premières loges pour se délecter des termites imprudentes.

NOM : Barbican à tête rouge (*Trachyphonus erythrocephalus*)

CLASSE : [Oiseaux](#)

ORDRE : Piciforme

FAMILLE : Lybiidés

TAILLE : 20 à 23 cm

POIDS : 50 à 70 g

DUREE DE VIE : Inconnue

REPARTITION : Tanzanie, Kenya, Ethiopie...

HABITAT : Terrains accidentés, zones, rocheuses, lits de rivières...

ALIMENTATION : [Omnivore](#) : Insectes, fruits, invertébrés....

REPRODUCTION : Pas ou peu d'informations concernant les moeurs de reproduction du barbican à tête rouge.

PREDATEURS : Serpents, rapaces, mammifères carnivores...