




LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Calao leucomèle

 Southern yellow billed hornbill



(Source ibc.lynxed.com)

Reconnaisable à son plumage noir et blanc , et ses ailes recouvertes de petites taches en forme d'écailles, le calao leucomèle, un des plus petits de son espèce, est originaire d'Afrique Australe. Se nourrissant essentiellement au sol, le calao leucomèle ornée de son bec puissant, recherche à l'aide de celui-ci, les graines et les insectes qui composent son repas. Solitaire et pas très grégaire, le calao leucomèle niche dans un trou d'arbre qu'il prend le soin de tapisser avec de l'herbe et des

feuilles. A cause de la couleur de son bec, le calao leucomèle est parfois surnommé "Banane volante"!

NOM : Calao leucomele (*Tockus leucomelas*)

CLASSE : [Oiseaux](#)

ORDRE : Bucerotiformes

FAMILLE : Bucerotidés

TAILLE : 40 à 60 cm, envergure : 1,80 m à 2,15 m

POIDS : 1,7 kg à 2,8 kg

DUREE DE VIE : 20 ans

REPARTITION : Afrique australe

HABITAT : Steppes, zones boisées, savanes, zone demi désertiques.

ALIMENTATION : [Granivore](#) : graines, araignées, scorpions...

REPRODUCTION : La maturité sexuelle du calao leucomèle est atteinte vers l'âge de 1 an, la durée d'incubation est de 25 jours et la femelle dépose 3 à 4 oeufs blancs.

PREDATEURS : [Aigle bateleur](#), faucon, serpents, mammifères grimpant aux arbres