




LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Canard branchu



Carolina wood duck



(Photo Monique Coulombe)

Le canard branchu ou canard carolin est endémique d'Amérique du Nord. Très coloré et possédant d'importants dimorphismes sexuelles (voir photos), le canard branchu est un oiseau percheur qui, munis de griffes acérées en plus de ses palmes, peut se hisser dans les arbres. Préférant les milieux humides et boisés, le canard branchu, dont

l'alimentation se compose essentiellement de graines, de fruits et de plantes aquatiques est un oiseau grégaire dont l'activité est diurne. Monogame pour une saison, le mâle canard branchu, peut choisir une autre partenaire la saison suivante, et ne participe pas à l'éducation des canetons.

NOM : Canard branchu ou canard carolin (*Aix sponsa*)

CLASSE : [Oiseaux](#)

ORDRE : [Ansériformes](#)

FAMILLE : [Anatidés](#)

TAILLE : 43 à 50 cm, envergure : 70 à 76 cm

POIDS : 540 à 680 g

DUREE DE VIE : 15 ans

REPARTITION : Canada, Est des Etats-unis, Mexique...

HABITAT : Zones humides boisées, lacs, étangs, marais, rivières...

ALIMENTATION : [Herbivore](#) : graines, fruits, plantes aquatiques, insectes...

REPRODUCTION : La maturité sexuelle du canard branchu est atteinte vers l'âge 1 an, la durée d'incubation est de 30 jours, et la femelle dépose 6 à 15 oeufs blanchâtres.

PREDATEURS : rapaces, renards, reptiles, poissons de grandes tailles...