




LES FICHES PEDAGOGIQUES



www.diconimoz.com

Spermophile rayé

 Thirteen-lined ground squirrel



(Source nps.gov.jpeg)

Peu commun, le spermophile rayé peut être facilement confondu avec le tamia. Il se différencie pourtant de celui-ci à son pelage constitué de 13 bandes tantôt brunes, tantôt dorées, parsemées de petites taches, et d'une absence de rayures sur la tête. Endémique d'Amérique du Nord, entre le Montana et le Texas, le spermophile

rayé, bien que non colonial, possède un comportement très proches du chien de prairie. Animal diurne, habitué aux forts ensoleillements, le spermophile rayé hiberne d' Août à Mars, et perd un tiers de son poids, durant cette période. Dotés d'une excellente vue et d'un excellent odorat, les spermophiles rayés sont cependant victimes d'une forte prédation, par les faucons et les serpents.

NOM : Spermophile rayée (*Spermophilus tridecemlineatus*)

CLASSE : [Mammifères](#)

ORDRE : [Rongeurs](#)

FAMILLE : [Sciuridés](#)

TAILLE : 20 à 25 cm

POIDS : 110 à 140 g

DUREE DE VIE : 8 ans

REPARTITION : Amérique du Nord (Montana, Ohio, Colorado, Arizona, Texas...)

HABITAT : Zones ouvertes, sols sableux ou limoneux...

ALIMENTATION : [Omnivore](#) : Herbes, feuilles, insectes, graines, noix, souris, oeufs, parfois charognes...

REPRODUCTION : La maturité sexuelle du spermophile rayée est atteinte vers l'âge de 10 mois, la durée de gestation est de 4 semaines et la femelle met bas jusqu' à 13 petits par portée.

PREDATEURS : Faucons, serpents, lynx...

Texte : ©Franck Badet