



LES FICHES PEDAGOGIQUES



[www.diconimoz.com](http://www.diconimoz.com)

# Rhinocéros de Sumatra

 Sumatran rhinoceros



(Source [animalspot.net](http://animalspot.net))

Plus petit spécimen de la famille des rhinocéridés, le rhinocéros de Sumatra est un animal extrêmement menacé, dont on croyait même, il y a quelques années, qu'il avait disparu. Comptant aujourd'hui, moins d'une centaine d'individus, répartis entre les îles de Sumatra et Bornéo, le rhinocéros de Sumatra qui comme ses cousins est herbivore, se nourrit principalement de feuilles, mais aussi de graminées et d'herbacés. Préférant les zones boueuses où il peut réguler sa chaleur et protéger sa

peau, le rhinocéros de Sumatra est un mammifère plutôt solitaire, qui ne se regroupera qu'au moment de l'accouplement. Descendant le plus proche du rhinocéros laineux préhistorique, le rhinocéros de Sumatra se distingue entre autres espèces, par sa taille déjà évoqué, mais également par la présence de poils bruns à rougeâtres, qui recouvrent certaines parties de son corps. Menacé par le braconnage, mais aussi par la destruction de son habitat lié à l'agriculture, le rhinocéros de Sumatra est classé par l'IUCN comme espèce en danger critique d'extinction.

**NOM :** Rhinocéros de Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*)

**CLASSE :** [Mammifères](#)

**ORDRE :** [Périsodactyle](#)

**FAMILLE :** Rhinocerotidés

**TAILLE :** 3 m, 1,30 au garrot.

**POIDS :** 1000 kg

**LONGEVITE :** 40 ans

**REPARTITION :** Sumatra, Bornéo

**HABITAT :** Forêts denses

**ALIMENTATION :** [Herbivore](#) : Feuilles, Herbes, broussailles, petits arbustes..

**REPRODUCTION :** La maturité sexuelle du rhinocéros de Sumatra est atteinte vers l'âge de 7 à 8 ans, la durée de gestation est de 15 mois et la femelle met bas 1 ou 2 petits.

**PREDATEURS :** L'homme

**STATUT DE CONSERVATION IUCN :** CR EN DANGER CRITIQUE

*Texte : ©Franck Badet*