




LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Myrmidon

 Silky anteater



(Image sous licence creative commons 3.0 Quinten Questel.jpg)

Le myrmidon ou fourmilier nain est le plus petit de tous les fourmiliers. Ne mesurant pas plus de 45 cm, ce petit animal de la famille des cyclopédidés est le seul de son espèce. Endémique d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, le myrmidon dont le régime alimentaire est constitué principalement de fourmis et de petits insectes, est un mammifère nocturne et arboricole qui fréquente les forêts de plaines et adore se camoufler dans les arbres. Solitaire et

assez difficile à observer, le myrmidon est un animal extrêmement méconnu , mais dont la préoccupation reste mineur dans le classement IUCN.

NOM : Myrmidon (*Cyclopes didactylus*)

CLASSE : [Mammifères](#)

ORDRE : Pilosa

FAMILLE : Cyclopédidés

TAILLE : 36 à 45 cm

POIDS : 200 à 400 g

DUREE DE VIE : 2 ans

REPARTITION : Mexique, Guyane, Equateur, Pérou, Bolivie, Brésil...

HABITAT : Forêts tropicales, mangroves...

ALIMENTATION : [Insectivore](#) : fourmis, coléoptères....

REPRODUCTION : Si l'on ne connaît pas exactement l'âge auquel le myrmidon atteint sa maturité sexuelle, on sait tout de même, que la période de gestation dure de 120 à 150 jours et que la femelle donne naissance à un seul petit par portée.

PREDATEURS : [Harpie féroce](#), faucons...